



# Indicaciones para uso de mascarillas en pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19

<p><b>Precauciones Específicas de Aislamiento por Gotas</b></p> <p><b>Mascarilla quirúrgica (cubre bocas)</b></p> 	<p><b>Precauciones Específicas de Aislamiento Vía Aérea (solo se usaran en estos procedimientos)</b></p> <p><b>Respirador N95 solo en procedimientos que ocasionan aerosoles</b></p> 
<p>Si tiene síntomas respiratorios (tos/estornudos/rinorrea) Pacientes o personal de salud</p>	<p>Intubación, extubación, colocación y retiro de mascarilla laríngea, colocación de CPAP, BiPAP, Ventilación Invasiva y no Invasiva, Ventilación con Bolsa Válvula Mascarilla</p>
<p>Cuidador directo de un paciente</p>	<p>Reanimación cardiopulmonar</p>
<p>Personal de salud en contacto con paciente Técnico de radiología Personal dietología Camilleros Personal de ambulancia Personal de limpieza Familiar en contacto con el paciente</p>	<p>Broncoscopia, endoscopia, cirugía</p>
<p>Personal de salud que realiza actividades ocasionales en áreas de pacientes: De electromedicina De mantenimiento De soporte técnico De rehabilitación</p>	<p>Inducción de esputo, nebulizaciones, aspiración de secreciones, Hisopado Nasofaríngeo, Exudado Faríngeo, Autopsia</p>
<p>Recomendaciones: Higiene de manos frecuente, tener cuidado en la colocación y retiro de protección de personal, evitar nebulización e inducción de esputo. PEA de vía aérea consiste en usar N95 UTILIZAR UNA MASCARILLA CUANDO NO ESTA RECOMENDADO CREA UNA SENSACIÓN DE FALSA SEGURIDAD</p>	

Comité de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud. Instituto Nacional de Pediatría. CIAAS INP

Referencia: WHO. [https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE\\_use-2020.2-eng.pdf](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf) 19/03/2020



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

